



## Synthèse

Contrairement à la population adulte, dont la consommation de tabac s'avère en retrait (23 % d'utilisateurs quotidiens contre 27 % au niveau national), les jeunes de la région Pays-de-la-Loire ont un niveau d'expérimentation supérieur à la moyenne métropolitaine (67 % vs 59 %). La mortalité liée aux cancers des voies pulmonaires demeure dans la moyenne nationale.

S'agissant de l'alcool, si les adultes se distinguent uniquement par un niveau d'expérimentation au-dessus de la moyenne nationale, les jeunes de 17 ans de la région Pays-de-la-Loire présentent des expérimentations, usages d'alcool et niveaux d'alcoolisation ponctuelle importante constamment plus élevés. Dans ce contexte, les indicateurs de mortalité liés à l'alcool sont supérieurs à la moyenne nationale.

La consommation de cannabis des adultes de la région Pays-de-la-Loire s'avère en retrait par rapport aux autres (41 % vs 45 % pour l'expérimentation et 2 % vs 4 % pour l'usage régulier). A contrario, les jeunes garçons affichent des niveaux d'expérimentation et d'usage dans le mois supérieurs à ceux de leurs homologues des autres régions. Les interpellations pour infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) sont peu fréquentes comparativement aux autres régions.

Enfin, les adultes de la région Pays-de-la-Loire présentent des niveaux inférieurs d'expérimentation d'autres produits illicites comparés aux autres régions (cocaïne, LSD, amphétamines, crack). Les jeunes de 17 ans se situent quant à eux dans la moyenne nationale pour l'ensemble des consommations de produits. La mortalité due aux accidents de la route ou aux surdoses liés à l'usage de drogues illicites s'avère en retrait dans la région.

## Usages de produits psychoactifs à l'âge adulte (18-75 ans pour l'alcool et le tabac, 18-64 ans pour les autres produits) en 2017 dans la région Pays-de-la-Loire et en France métropolitaine (%)


|   |  | Région PDL |           |               | France métropolitaine |             |                |
|---|--|------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------|----------------|
|   |  | H (n=683)  | F (n=914) | Ens. (n=1597) | H (n=11596)           | F (n=13723) | Ens. (n=25319) |
| Alcool                                    | Expérimentation                            | 98*        | 97*       | 98*           | 96,1                  | 93,1        | 94,6           |
|   | Usage régulier (≥ 10 usages dans le mois)  | 30         | 8         | 19            | 28,4                  | 9,7         | 18,8           |
|   | Usage quotidien (≥ 30 usages dans le mois) | 16         | 3*        | 9             | 16,1                  | 5,4         | 10,6           |
| Alcoolisation ponctuelle importante (API) | Dans le mois (≥ 1 fois)                    | 29         | 7         | 17            | 25,2                  | 7,6         | 16,2           |
| Tabac                                     | Expérimentation                            | 81         | 72        | 76            | 81,2                  | 70,5        | 75,7           |
|   | Quotidien (≥ 1 cigarette/jour)             | 25*        | 21        | 23*           | 29,8                  | 24,2        | 27,0           |
|   | Intensif (≥ 10 cigarettes/jour)            | 12*        | 21        | 10*           | 15,7                  | 10,2        | 12,8           |
| Cannabis                                  | Expérimentation                            | 49         | 34        | 41*           | 52,7                  | 37,2        | 44,8           |
|   | Usage dans l'année                         | 12         | 5*        | 8*            | 15,1                  | 7,1         | 11,0           |
|   | Usage régulier (≥ 10 usages dans le mois)  | 3          | 1         | 2*            | 5,4                   | 1,8         | 3,6            |
| Poppers                                   | Expérimentation                            | 11         | 6         | 8             | 11,7                  | 5,8         | 8,7            |
| Cocaïne                                   | Expérimentation                            | 6          | 2*        | 4*            | 8,0                   | 3,2         | 5,6            |
| MDMA/ecstasy                              | Expérimentation                            | 8          | 2         | 5             | 7,3                   | 2,7         | 5,0            |
| Champignons hallucinogènes                | Expérimentation                            | 6          | 2         | 4             | 8,0                   | 2,7         | 5,3            |
| LSD                                       | Expérimentation                            | 3          | <0,5*     | 1*            | 4,0                   | 1,4         | 2,7            |
| Amphétamines                              | Expérimentation                            | 2          | 1*        | 1*            | 3,2                   | 1,2         | 2,2            |
| Héroïne                                   | Expérimentation                            | 1          | <0,5      | 1             | 2,1                   | 0,5         | 1,3            |
| Crack                                     | Expérimentation                            | <0,5       | <0,5      | <0,5*         | 1,1                   | 0,3         | 0,7            |

Source : Baromètre Santé 2017, SPF

Note : Les prévalences régionales sont arrondies à l'unité près pour des raisons d'effectif.

Note de lecture : 25\* signifie que l'usage quotidien de tabac des hommes dans la région est inférieur (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues du reste de la France.

## Évolution des usages quotidiens de tabac et des usages réguliers d'alcool et de cannabis à l'âge adulte dans la région Pays-de-la-Loire et en France métropolitaine entre 2005 et 2017 (%)



Sources : Baromètre Santé 2005, 2010, 2014, 2017, SPF



## Usages de produits psychoactifs à 17 ans en 2017 dans la région Pays-de-la-Loire et en France métropolitaine (%)


|   |   | Région PDL |            |               | France métropolitaine |             |                |
|---|---|------------|------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------|
|   |   | H (n=1211) | F (n=1199) | Ens. (n=2410) | H (n=19611)           | F (n=19504) | Ens. (n=39115) |
| Alcool                                    | Expérimentation                           | 93*        | 92*        | 92*           | 86,6                  | 84,6        | 85,7           |
|   | Usage dans le mois (≥ 1 usage)            | 79*        | 73*        | 76*           | 69,9                  | 62,9        | 66,5           |
|   | Usage régulier (≥ 10 usages dans le mois) | 18*        | 5          | 12*           | 12                    | 4,6         | 8,4            |
| Alcoolisation ponctuelle importante (API) | Répétées (≥ 3 fois dans le mois)          | 30*        | 13*        | 22*           | 21,7                  | 10,9        | 16,4           |
| Tabac                                     | Expérimentation                           | 61*        | 64*        | 63*           | 58,1                  | 59,9        | 59,0           |
|   | Quotidien (≥ 1 cigarette/jour)            | 28         | 25         | 26            | 26,3                  | 23,8        | 25,1           |
|   | Intensif (≥ 10 cigarettes/jour)           | 6          | 4          | 5             | 6,5                   | 3,9         | 5,2            |
| Cannabis                                  | Expérimentation                           | 46*        | 36         | 41            | 41,8                  | 36,3        | 39,1           |
|   | Usage dans le mois                        | 27*        | 18         | 23            | 24,2                  | 17,5        | 21             |
|   | Usage régulier (≥ 10 usages dans le mois) | 10         | 5          | 7             | 9,7                   | 4,5         | 7,2            |
| Poppers                                   | Expérimentation                           | 13*        | 10*        | 11*           | 9,5                   | 8           | 8,8            |
| Cocaïne                                   | Expérimentation                           | 4*         | 2          | 3             | 3,1                   | 2,4         | 2,8            |
| MDMA/ecstasy                              | Expérimentation                           | 5          | 2          | 3             | 3,9                   | 2,8         | 3,4            |
| Champignons hallucinogènes                | Expérimentation                           | 4          | 2          | 3             | 3,6                   | 1,9         | 2,8            |
| LSD                                       | Expérimentation                           | 2          | 1          | 2             | 1,9                   | 1,2         | 1,6            |
| Amphétamines                              | Expérimentation                           | 4*         | 1          | 3             | 2,8                   | 1,8         | 2,3            |
| Héroïne                                   | Expérimentation                           | 1          | 1          | 1             | 0,7                   | 0,6         | 0,7            |
| Crack                                     | Expérimentation                           | 1          | 1          | 1             | 0,6                   | 0,6         | 0,6            |

Source : ESCAPAD 2017, OFDT

Note : Les prévalences régionales sont arrondies à l'unité près pour des raisons d'effectif.

Note de lecture : 61\* signifie que le niveau d'expérimentation de tabac des garçons dans la région est supérieur (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues du reste de la France.

## Évolution des usages quotidiens de tabac et des usages réguliers d'alcool et de cannabis à 17 ans dans la région Pays-de-la-Loire et en France métropolitaine entre 2005 et 2017 (%)



Sources : ESCAPAD 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, OFDT



## Indicateurs reflétant les conséquences sanitaires des usages de produits psychoactifs

|  |   | <b>Pays-de-la-Loire</b> | <b>France entière</b> | <b>Rang</b><br>(parmi les 13 régions métropolitaines) |
|--|---|-------------------------|-----------------------|---|
| Décès avant 65 ans par cancers du poumon, des bronches et de la trachée (2016) <sup>1</sup>              | Pour 10 000 habitants de 40 à 64 ans                          | 5,2                     | 5,1                   | 9   |
| Décès avant 65 ans par alcoolisme et cirrhose (2016) <sup>1</sup>  | Pour 10 000 habitants de 40 à 64 ans                          | 2,7                     | 2,3                   | 4   |
| Accidents corporels avec alcool (2017) <sup>2</sup>  | Pour 100 accidents corporels au taux d'alcoolémie connu       | 14,8                    | 11,7                  | 6   |
| Accidents mortels avec alcool (2017) <sup>2</sup>  | Pour 100 accidents mortels au taux d'alcoolémie connu         | 35,6                    | 30,2                  | 2   |
| Accidents mortels avec présence de stupéfiants (2017) <sup>2</sup>                                       | Pour 100 accidents mortels avec dépistage stupéfiants réalisé | 16,0                    | 22,3                  | 11  |
| Nombre de patients théoriques traités par médicaments de substitution aux opioïdes (2017) <sup>3,4</sup> | Pour 100 000 habitants de 15 à 74 ans                         | 218,5                   | 328,1                 | 12  |
| Décès par surdoses (2016) <sup>1</sup>   | Pour 100 000 habitants de 15 à 74 ans                         | 0,7                     | 0,9                   | 13  |

Sources : (1) INSERM-CépiDc, (2) ONISR, (3) GERS-Siamois, (4) Bouchara-Recordati

## Autres indicateurs liés aux usages de produits psychoactifs

|   |                                      | <b>Pays-de-la-Loire</b> | <b>France entière</b> | <b>Rang</b><br>(parmi les 13 régions métropolitaines) |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| Interpellations pour ivresse sur la voie publique (2017) <sup>1</sup>                               | Pour 10 000 habitants de 15 à 74 ans | 10,3                    | 10,9                  | 8   |
| Infractions à la législation sur les stupéfiants pour ventes et usages/reventes (2018) <sup>2</sup> | Pour 10 000 habitants de 15 à 74 ans | 28,3                    | 41,2                  | 11  |

Sources : (1) DGGN/DGPN/Préfecture de police de Paris, (2) Etat 4001