



Synthèse

S'agissant de l'alcool, si les adultes se distinguent par un niveau d'expérimentation (97,2 % vs 94,3 %) et un niveau d'usage au cours du mois au-dessus de la moyenne nationale, les jeunes de 17 ans de la région Pays-de-la-Loire présentent des expérimentations (87,9 % vs 80,6 %), usages d'alcool et niveaux d'alcoolisation ponctuelle importante (23,1 % vs 13,6 %) plus élevés. Dans ce contexte, les indicateurs de mortalité liés à l'alcool sont légèrement supérieurs à la moyenne nationale, et les accidents de la route mortels en lien avec l'alcool les plus fréquents du territoire.

Contrairement à la population adulte, dont la consommation de tabac s'avère dans la moyenne nationale, les jeunes de la région Pays-de-la-Loire ont une consommation de tabac plus importante quel que soit l'indicateur considéré. L'expérimentation, tout comme l'usage quotidien sont supérieurs à la moyenne métropolitaine (respectivement 52,5 % vs 46,5 %, 18,2 % vs 15,6 %). La mortalité liée aux cancers des voies pulmonaires demeure dans la moyenne nationale (30,7 décès pour 100 000 habitants de 35- 64 ans vs 30,9).

La consommation de cannabis des adultes de la région Pays-de-la-Loire s'avère là encore dans la moyenne nationale. A contrario, les jeunes affichent des niveaux d'expérimentation (33,6 % vs 29,9 %) et d'usage dans le mois (16,1 % vs 13,9 %) supérieurs à ceux de leurs homologues des autres régions. Enfin, les adultes de la région Pays-de-la-Loire présentent des niveaux d'expérimentation d'autres produits illicites comparables aux autres régions, à l'exception du poppers (21,8 % vs 14,9 %) dont la consommation est supérieure à la moyenne nationale. Les jeunes de 17 ans se situent quant à eux dans la moyenne nationale pour l'ensemble des produits, à l'exception du poppers (19,1 % vs 11,0 %) de la kétamine (1,6 % vs 1,0 %) légèrement plus expérimentée.

Dans ce contexte, les mises en cause et les amendes forfaitaires pour usage ou trafic de stupéfiants sont peu répandues dans la région comparativement au reste du territoire.

Usages de produits psychoactifs à l'âge adulte (18-75 ans pour l'alcool et le tabac, 18-64 ans pour les autres produits) en 2023 dans la région Pays-de-la-Loire et en France métropolitaine (%)

Produit	Usage	Pays de la Loire			Hexagone		
		Hommes (n=431)	Femmes (n=461)	Ensemble (n=892)	Hommes (n=7285)	Femmes (n=7699)	Ensemble (n=14984)
Alcool	Expérimentation	97,1	97,3*	97,2*	95,3	93,3	94,3
	Dans le mois	43,4*	18,6	30,1*	34,5	17,9	26,1
	Quotidien	10,6	3,6	6,9	10,4	3,8	7,0
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Dans le mois	27,4*	9,5	17,8*	22,1	8,1	14,9
Tabac	Expérimentation	83,6	77,1	80,1	82,2	75,1	78,5
	Quotidien	25,5	20,7	22,9	25,4	20,9	23,1
Cigarette électronique	Expérimentation	47,1	41,2	43,9	45,1	38,7	41,8
	Quotidien	7,8	5,3	6,5	6,8	5,4	6,1
Cannabis	Expérimentation	59,5	44,4	51,3	57,6	43,4	50,4
	Dans le mois	15,7	8,0	11,5	14,5	7,2	10,8
	Régulier	5,8	2,7	4,2	4,9	2,0	3,4
Poppers	Expérimentation	25,4*	18,7*	21,8*	17,4	12,4	14,9
Protoxyde d'azote	Expérimentation	8,4	4,0	6,1	8,6	5,0	6,7
Cocaïne	Expérimentation	16,2	6,0	10,7	13,4	5,5	9,4
MDMA (Ecstasy)	Expérimentation	15,3*	4,3	9,3	11,7	4,9	8,2
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	13,2	4,6	8,6	11,7	4,5	8,0
LSD	Expérimentation	8,2	2,3	5,0	6,8	2,5	4,6
Amphétamines	Expérimentation	7,3	3,0	5,0	6,3	2,4	4,3
Héroïne	Expérimentation	3,0	1,2	2,0	3,0	1,1	2,0
Crack	Expérimentation	3,4	0,7	1,9	2,1	0,7	1,4
Kétamine	Expérimentation	4,0	1,9	2,9	3,7	1,6	2,6

Source : EROPP 2023, OFDT

Note de lecture : 95,4 %* signifie que l'expérimentation d'alcool dans la région est supérieure (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui du reste de la France.


Usages de produits psychoactifs à 17 ans en 2022 dans la région Pays-de-la-Loire et en France métropolitaine (%)

		Pays de la Loire			Hexagone		
		Garçons (n=797)	Filles (n=741)	Ensemble (n=1538)	Garçons (n=11175)	Filles (n=11255)	Ensemble (n=22430)
Alcool	Expérimentation	88,0*	87,9*	87,9*	81,0	80,3	80,6
	Usage dans le mois	70,5*	67,7*	69,2*	59,7	57,4	58,6
	Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois)	19,7*	6,1*	13,0*	9,8	4,4	7,2
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Répétées (au moins 3 fois dans le mois)	29,4*	16,6*	23,1*	16,4	10,6	13,6
Tabac	Expérimentation	53,0*	51,9*	52,5*	46,2	46,9	46,5
	Usage quotidien (au moins 1 cigarette par jour)	21,4*	14,8	18,2*	17,0	14,2	15,6
	Usage quotidien (plus de 10 cigarettes par jour)	6,9*	2,9	4,9*	5,0	2,3	3,7
Cigarette électronique	Expérimentation	62,8*	56,1	59,6*	57,8	55,9	56,9
	Usage quotidien	7,2	6,5	6,9	6,0	6,3	6,2
Cannabis	Expérimentation	37,1*	30,0	33,6*	31,7	28,0	29,9
	Usage dans le mois	20,1*	11,8	16,1*	15,5	12,2	13,9
	Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois)	7,1*	2,1	4,6	5,3	2,2	3,8
Poppers	Expérimentation	21,0*	17,1*	19,1*	10,9	11,0	11,0
Protoxyde d'azote	Expérimentation	2,7	1,5	2,1	2,8	1,8	2,3
Cocaïne	Expérimentation	1,7	1,3	1,5	1,5	1,3	1,4
MDMA (Ecstasy)	Expérimentation	2,8	1,5	2,2	2,1	1,8	2,0
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	1,7	<0,5	1,1	1,4	0,9	1,1
LSD	Expérimentation	2,1	0,6	1,3	1,2	0,8	1,0
Amphétamines	Expérimentation	2,3*	<0,5	1,3	1,0	0,8	0,9
Héroïne	Expérimentation	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Crack	Expérimentation	0,6	<0,5	<0,5	0,4	0,3	0,4
Kétamine	Expérimentation	2,3*	0,9	1,6*	1,1	0,8	1,0

Source : ESCAPAD 2022, OFDT


Note de lecture : 67,7 %* signifie que l'usage d'alcool dans le mois des filles dans la région est supérieur (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues du reste de la France.

Évolution des usages quotidiens de tabac et d'alcool et de l'usage régulier de cannabis en population adulte dans la région Pays-de-la-Loire et en France métropolitaine entre 2005 et 2023 (%)



Sources : Baromètre Santé 2005, 2010, 2014, 2017, SPF ; EROPP 2023, OFDT

Évolution des usages quotidiens de tabac et des usages réguliers d'alcool et de cannabis à 17 ans dans la région Pays-de-la-Loire et en France métropolitaine entre 2005 et 2022 (%)



Sources : ESCAPAD 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2022, OFDT

Autres indicateurs liés aux usages de produits psychoactifs

Indicateur	Unité	Pays-de-la-Loire	France hexagonale	Rang (parmi les 13 régions hexagonales)
Mise en cause pour usage de stupéfiants (2023) ¹	Pour 10 000 habitants	22,1	38,9	13
Amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour usage de stupéfiants (2023) ¹	Pour 10 000 habitants	10,6	24,1	12
Mise en cause pour trafic de stupéfiants (2023) ¹	Pour 10 000 habitants	4,2	7,1	10
Accidents mortels avec alcool (2023) ²	Pour 100 accidents mortels au taux d'alcoolémie connu	38	31	1
Accidents mortels avec présence de stupéfiants ou alcool (2023) ²	Pour 100 accidents mortels avec dépistage stupéfiants/alcool réalisé	49	42	1
Décès par maladies alcooliques du foie entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	9,0	7,9	4
Décès par cancer du poumon entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	30,7	30,9	10
Décès par cancer des voies aérodigestives supérieures entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	10,5	9,4	5
Décès par maladies chroniques des voies respiratoires inférieures entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	4,0	4,4	8

Sources : SSMSI (1), (2) ONISR, (3) INSERM-CépiDc

Note de lecture : on dénombre 22,1 mises en causes pour usage de stupéfiants pour 10 000 habitants contre 38,9 dans le reste de la France, ce qui positionne la région au 13^{ème} rang sur 13 régions de l'hexagone.