



Usages et conséquences liés aux produits psychoactifs

Centre-Val de Loire



Synthèse

Concernant l'alcool, tandis que les adultes de la région ne se différencient pas de la moyenne nationale, les jeunes de 17 ans se démarquent par des alcoolisations ponctuelles importantes et un usage régulier (5,1 % vs 7,2 %) moins fréquents. En termes de conséquences des usages, la région Centre-Val-de-Loire affiche un niveau de mortalité prématuée liée à l'alcool, que cela soit des maladies alcooliques du foie ou des accidents de la route, dans la moyenne nationale.

En matière de tabagisme, la population adulte de la région Centre-Val-de-Loire, tout comme la population adolescente de 17 ans, ne se distingue pas de la moyenne nationale, à l'exception de l'expérimentation pour les adultes, légèrement en retrait dans la région. Parallèlement, la mortalité par cancers du poumon se situe au-dessus de la moyenne nationale (37,3 décès pour 10 000 habitants de 35 à 64 ans vs 30,9).

Pour le cannabis, le niveau d'expérimentation dans la région parmi les adultes s'avère moins élevé que dans le reste du territoire (42,4 % vs 50,4 %). S'agissant des usages récents, la région se situe dans la moyenne nationale pour les deux populations. Concernant les autres produits illicites, les niveaux d'usage chez les adultes de la région Centre-Val-de-Loire sont dans la moyenne métropolitaine, exceptés pour les champignons hallucinogènes et le poppers dont l'expérimentation s'avère moins répandue. Parmi les adolescents de 17 ans, les niveaux d'expérimentation sont également semblables à ceux du reste de la France hexagonale.

Dans ce contexte, les mises en cause pour usage ou trafic de stupéfiants ainsi que les amendes forfaitaires pour usage de stupéfiants le nombre d'interpellations s'avèrent moins fréquentes dans la région. Ainsi on dénombre 22,2 mises en cause pour usage pour 10 000 habitants contre 38,9 sur l'ensemble du territoire.

Usages de produits psychoactifs à l'âge adulte (18-75 ans pour l'alcool et le tabac, 18-64 ans pour les autres produits) en 2023 dans la région Centre-Val de Loire et en France métropolitaine (%)

| Produit | Usage | Centre Val de Loire | | | Hexagone | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Hommes (n=307) | Femmes (n=337) | Ensemble (n=644) | Hommes (n=7285) | Femmes (n=7699) | Ensemble (n=14984) |
| Alcool | Expérimentation | 94,8 | 95,4 | 95,1 | 95,3 | 93,3 | 94,3 |
| | Dans le mois | 33,6 | 15,6 | 23,8 | 34,5 | 17,9 | 26,1 |
| | Quotidien | 11,7 | 5,2 | 8,2 | 10,4 | 3,8 | 7,0 |
| Alcoolisation ponctuelle importante (API) | Dans le mois | 18,5 | 7,3 | 12,5 | 22,1 | 8,1 | 14,9 |
| Tabac | Expérimentation | 77,7* | 73,8 | 75,6* | 82,2 | 75,1 | 78,5 |
| | Quotidien | 27,3 | 23,9 | 25,5 | 25,4 | 20,9 | 23,1 |
| Cigarette électronique | Expérimentation | 42,4 | 36,5 | 39,2 | 45,1 | 38,7 | 41,8 |
| | Quotidien | 6,6 | 5,1 | 5,8 | 6,8 | 5,4 | 6,1 |
| Cannabis | Expérimentation | 47,1* | 37,9* | 42,4* | 57,6 | 43,4 | 50,4 |
| | Dans le mois | 11,9 | 5,8 | 8,7 | 14,5 | 7,2 | 10,8 |
| | Régulier | 4,2 | 2,3 | 3,2 | 4,9 | 2,0 | 3,4 |
| Poppers | Expérimentation | 11,3* | 10,6 | 10,9* | 17,4 | 12,4 | 14,9 |
| Protoxyde d'azote | Expérimentation | 7,7 | 4,6 | 6,1 | 8,6 | 5,0 | 6,7 |
| Cocaïne | Expérimentation | 8,5* | 6,2 | 7,3 | 13,4 | 5,5 | 9,4 |
| MDMA (Ecstasy) | Expérimentation | 11,1 | 4,3 | 7,6 | 11,7 | 4,9 | 8,2 |
| Champignons hallucinogènes | Expérimentation | 7,7* | 2,9 | 5,2* | 11,7 | 4,5 | 8,0 |
| LSD | Expérimentation | 5,9 | 2,6 | 4,2 | 6,8 | 2,5 | 4,6 |
| Amphétamines | Expérimentation | 4,6 | 1,6 | 3,1 | 6,3 | 2,4 | 4,3 |
| Héroïne | Expérimentation | 2,1 | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 1,1 | 2,0 |
| Crack | Expérimentation | 2,9 | 0,1 | 1,5 | 2,1 | 0,7 | 1,4 |
| Kétamine | Expérimentation | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 3,7 | 1,6 | 2,6 |

Source : EROPP 2023, OFDT

Note de lecture : 79,9 %* signifie que l'expérimentation de tabac des hommes dans la région est inférieure (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues du reste de la France.



Mise à jour : mai 2025


Usages de produits psychoactifs à 17 ans en 2022 dans la région Centre-Val de Loire et en France métropolitaine (%)

| | | Centre-Val de Loire | | | Hexagone | | |
|---|--|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Garçons (n=528) | Filles (n=479) | Ensemble (n=1007) | Garçons (n=11175) | Filles (n=11255) | Ensemble (n=22430) |
| Alcool | Expérimentation | 81,0 | 84,8* | 82,9 | 81,0 | 80,3 | 80,6 |
| | Usage dans le mois | 57,3 | 56,6 | 57,0 | 59,7 | 57,4 | 58,6 |
| | Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois) | 7,6 | 2,4* | 5,1* | 9,8 | 4,4 | 7,2 |
| Alcoolisation ponctuelle importante (API) | Répétées (au moins 3 fois dans le mois) | 13,9 | 8,4 | 11,2* | 16,4 | 10,6 | 13,6 |
| Tabac | Expérimentation | 45,7 | 42,1* | 44,0 | 46,2 | 46,9 | 46,5 |
| | Usage quotidien (au moins 1 cigarette par jour) | 19,6 | 12,6 | 16,3 | 17,0 | 14,2 | 15,6 |
| | Usage quotidien (plus de 10 cigarettes par jour) | 5,7 | 2,2 | 4,0 | 5,0 | 2,3 | 3,7 |
| Cigarette électronique | Expérimentation | 56,8 | 52,2 | 54,6 | 57,8 | 55,9 | 56,9 |
| | Usage quotidien | 4,6 | 5,1 | 4,9 | 6,0 | 6,3 | 6,2 |
| Cannabis | Expérimentation | 31,3 | 23,0* | 27,2 | 31,7 | 28,0 | 29,9 |
| | Usage dans le mois | 15,2 | 10,0 | 12,7 | 15,5 | 12,2 | 13,9 |
| | Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois) | 5,1 | 2,2 | 3,7 | 5,3 | 2,2 | 3,8 |
| Poppers | Expérimentation | 10,6 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 11,0 | 11,0 |
| Protoxyde d'azote | Expérimentation | 2,9 | 0,7 | 1,8 | 2,8 | 1,8 | 2,3 |
| Cocaïne | Expérimentation | 0,8 | <0,5 | 0,6* | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| MDMA (Ecstasy) | Expérimentation | 1,7 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 2,0 |
| Champignons hallucinogènes | Expérimentation | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 1,1 |
| LSD | Expérimentation | 0,5 | <0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
| Amphétamines | Expérimentation | <0,5 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| Héroïne | Expérimentation | 0,5 | <0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Crack | Expérimentation | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Kétamine | Expérimentation | 1,5 | <0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |

Source : ESCAPAD 2022, OFDT


Note de lecture : 84,8 %* signifie que l'expérimentation de l'alcool des filles dans la région est supérieure (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues du reste de la France.

Évolution des usages quotidiens de tabac et d'alcool et de l'usage régulier de cannabis en population adulte dans la région Centre-Val de Loire et en France métropolitaine entre 2005 et 2023 (%)



Sources : Baromètre Santé 2005, 2010, 2014, 2017, SPF ; EROPP 2023, OFDT

Évolution des usages quotidiens de tabac et des usages réguliers d'alcool et de cannabis à 17 ans dans la région Centre-Val de Loire et en France métropolitaine entre 2005 et 2022 (%)



Sources : ESCAPAD 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2022, OFDT

Autres indicateurs liés aux usages de produits psychoactifs

| Indicateur | Unité | Centre-Val de Loire | France hexagonale | Rang (parmi les 13 régions hexagonales) |
|--|--|---------------------|-------------------|---|
| Mise en cause pour usage de stupéfiants (2023) ¹ | Pour 10 000 habitants | 22,2 | 38,9 | 12 |
| Amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour usage de stupéfiants (2023) ¹ | Pour 10 000 habitants | 12,6 | 24,1 | 8 |
| Mise en cause pour trafic de stupéfiants (2023) ¹ | Pour 10 000 habitants | 3,2 | 7,1 | 13 |
| Accidents mortels avec alcool (2023) ² | Pour 100 accidents mortels au taux d'alcoolémie connu | 31 | 31 | 7 |
| Accidents mortels avec présence de stupéfiants ou alcool (2023) ² | Pour 100 accidents mortels avec dépistage stupéfiants/alcool réalisé | 40 | 42 | 9 |
| Décès par maladies alcooliques du foie entre 35 et 64 ans (2022) ³ | Pour 100 000 habitants de 35-64 ans | 8,0 | 7,9 | 7 |
| Décès par cancer du poumon entre 35 et 64 ans (2022) ³ | Pour 100 000 habitants de 35-64 ans | 37,3 | 30,9 | 3 |
| Décès par cancer des voies aérodigestives supérieures entre 35 et 64 ans (2022) ³ | Pour 100 000 habitants de 35-64 ans | 10,5 | 9,4 | 5 |
| Décès par maladies chroniques des voies respiratoires inférieures entre 35 et 64 ans (2022) ³ | Pour 100 000 habitants de 35-64 ans | 4,1 | 4,4 | 7 |

Sources : SSMSI (1), (2) ONISR, (3) INSERM-CépiDc

Note de lecture : on dénombre 22,2 mises en causes pour usage de stupéfiants pour 10 000 habitants contre 38,9 dans le reste de la France, ce qui positionne la région au 12^{ème} rang sur 13 régions de l'hexagone.



Mise à jour : mai 2025